

EMPFEHLUNGEN

für Einstreualternativen

Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen!

Diese sind ausschließlich zur Orientierung gedacht und können/werden varrieren je nach Haltungsform, Pferdetyt und anderen Gegebenheiten!

Diese Gegenüberstellung soll einen ersten Eindruck zum Verbrauch geben nicht mehr und nicht weniger!

Vorbereitung und Pflege der Box:

- Box leeren, säubern und desinfizieren
- nasse Stellen regelmäßig entfernen und täglich abäppeln
- grundsätzlich ist es bei Pferden sinnvoll jede Box ca. 3 Tage nach einer Wurmkurgabe komplett zu misten und frisch einzustreuen!

PRODUKTE	GEBINDE IN KG	BOXEN-GRÖSSE IN m ²	GRUNDEINSTREU IN BALLE/SACK	NACHSTREU PRO WOCHE BALLE/SACK	KOMPLETTER AUS-TAUSCH DER INSTREU	HINWEIS
KANTRIE Hobelspäne Profi	24	12 m ²	4-5	1-2	Ermessenssache, k.A.	
KANTRIE Hobelspäne Champ	24	12 m ²	4-5	1-2	Ermessenssache, k.A.	
KANTRIE Hobelspäne XL	24	12 m ²	4-5	1-2	Ermessenssache, k.A.	
Lin-O-Star Leinenstroh	20	12 m ²	6	1	Ca. alle 10-12 Wochen	Auf einem gesäuberten, feuchten Boden dick ausstreuen
Euro-Lin Leinenstroh	20	12 m ²	5 Einstreuhöhe zu Beginn ca. 5-7 cm	½-1	Alle 6 Monate	Matratzenbildung fördern: Um das Kapillarsystem des Leinenstrohs zu aktivieren (optimale Bindung des Urins) und die Matratzenbildung zu beschleunigen, kann die frische Einstreu mit ca. 5 bis 10 l Wasser aus einer Gießkanne gleichmäßig befeuchtet werden
Weichholzgranulat	24	12 m ²	3-4	1-2	Ermessenssache, k.A.	
Biolan Strohpellets	52 l ca. 24 kg	12 m ²	6-7 • Einstreuhöhe zu Beginn ca. 5 cm • mit Wasser anfeuchten	Nach 3-4 Wochen nachstreuen	Ca. alle 12 Wochen	Nach dem Abäppeln, die Matte mit der Gabel leicht durchkratzen
GOLDSPAN champ Pellets	15	12 m ²	8-9 Mit 1-2 Gießkannen anfeuchten	1-3	Ermessenssache, k.A.	Entstandene Löcher, die durch Entfernen von nassen Stellen oder abäppeln entstehen, ohne zusätzliches Anfeuchten, wieder auffüllen
Miscanthus Pellets	15	12 m ²	12 • Einstreuhöhe zu Beginn ca. 5 cm • mit 1-2 Gießkannen anfeuchten	Bei Bedarf frisch überstreuen	Alle 3-4 Monate mindestens jedoch alle 6 Monate	

EMPFEHLUNGEN

für Einstreualternativen

PRODUKTE	GEBINDE IN KG	BOXEN-GRÖSSE IN m ²	GRUNDEINSTREU IN BALLE/SACK	NACHSTREU PRO WOCHE BALLE/SACK	KOMPLETTER AUS-TAUSCH DER INSTREU	HINWEIS
Equi-Streu	12	12 m ²	12	2-3	Ca. 3 Tage nach jeder Entwurmung	Für mehr Volumen 5 l Wasser/1 m ² anfeuchten und mit einer Spänegabel untermengen Bei Fressverhalten:
Equi-Pellets	20	12 m ²	6 für mehr Volumen 5 l Wasser/1 m ² anfeuchten und mit Spänegabel untermengen	1-2	Ca. 3 Tage nach jeder Entwurmung	<ul style="list-style-type: none"> • neue Einstreu zunächst unter bestehendes Einstreu beimischen • über 14 Tage Einstreu austauschen und mit Equi-Streu oder Equi-Pellets nachstreuen • optional: 0,5 l Speiseessig auf 10 l Wasser mischen (reicht für 2-3 m²)
AUBIOSE Hanfeinstreu mit und ohne Eukalyptus für Pferde	20	12 m ²	6-7 Einstreuhöhe ca. 13-14 cm	Bei Bedarf frisch überstreuen	Ca. 3 Tage nach jeder Entwurmung	<ul style="list-style-type: none"> • Streu nicht umgraben, sondern festtreten • evtl. aufgestiegene Nässe durch eine kleine Schicht trockene Streu überdecken • alle 5-10 Tage die trockene Schicht zur Seite nehmen, um die feuchte Schicht darunter freizulegen, wenn der Boden braun ist, die trockene Schicht wieder darüber ziehen und noch ein paar Tage liegen lassen – braune Aubiose ist noch absorbierend • wenn die nasse Schicht eher rot als braun ist, diese entfernen – trockene Einstreu von gesättigter (rötlicher) Aubiose entfernen – die noch vorhandene, trockene Aubiose bildet nun die neue Basis – diese bei Bedarf mit einem neuen Ballen auffüllen
Sägemehl	16 18 130 Liter-Sack=ca. 16-18 kg		Rinder: <ul style="list-style-type: none"> • Liegeboxen: 2-5 cm • Tiefstreubuchten: 10-15 cm Schweine: <ul style="list-style-type: none"> • Dünne Schicht als Ergänzung zu Stroh (1-3 cm) • Gute Feuchtigkeitsaufnahme, aber kann stauben 	Tägliches Nachstreuen empfohlen	Ermessenssache, k.A.	
Muh Mehl	600 (Big Bag)/lose		Einstreuhöhe mind. 10 cm	Keine Angaben	Keine Angaben	

EMPFEHLUNGEN

für Einstreualternativen

PRODUKTE	GEBINDE IN KG	BOXEN-GRÖSSE IN m ²	GRUNDEINSTREU IN BALLE/SACK	NACHSTREU PRO WOCHE BALLE/SACK	KOMPLETTER AUS-TAUSCH DER INSTREU	HINWEIS
Strohfix Classic, grün	20	k.A.	Rinder: • Tiefliegeboxen: ca. ½-1 Sack pro Box/Monat • Hochliegeboxen: ca. ½ Sack pro Box/Monat Pferde: ca. 3 ½-4 Säcke pro Pferdebox (weniger bei Boxen mit Gummimatten)	Pferde: ca. 1¼	Ermessenssache, k.A.	
Strohfix Maxi mit Gesteinsmehl, blau	20	k.A.	Keine Angaben	Ermessenssache, k.A.	Ermessenssache, k.A.	
Strohfix Spezial, rot	20	k.A.	3 ½-4 Ballen	1	Ermessenssache, k.A.	
Strohfix Extra Fein, schwarz	24	k.A.	Rinder: Hochliegeboxen: ca. ¼-½ Sack pro Box/Monat	Ermessenssache, k.A.	Ermessenssache, k.A.	
Dinkel-Streu für Geflügel	15	k.A.	Einstreuhöhe ca. 3-5 cm • Hähnchenmast: 0,4-0,8 kg/m ² • Legehennen: 0,6-1,0 kg/m ²	Ermessenssache, k.A.	• je nach Tieranzahl und Feuchtigkeitsentwicklung • meist genügt 1-2 mal pro Woche	Für Hobbyfarmer
Dinkel-Granulat für Geflügel	17	k.A.	Einstreuhöhe ca. 5-10 cm oder 600-800 g/m ²	Ermessenssache, k.A.	Je nach Tieranzahl und Feuchtigkeitsentwicklung	Für Hobbyfarmer und Mastbetriebe
Bionesto Stroheinstreu für Geflügel	50 l ca. 20 kg	k.A.	Hühner: Grundeinstreu 0,5 kg/m ² Puten: Grundeinstreu 5 kg/m ² Kaninchen: Einstreumatte 1-2 cm	Ermessenssache, k.A.	Ermessenssache, k.A.	Für Hobbyfarmer
AubiChick Hanfeinstreu für Geflügel	20	k.A.	Einstreumatte ca. 3-5 cm	Regelmäßig austauschen, um eine optimale Hygiene zu gewährleisten	Regelmäßig austauschen, um eine optimale Hygiene zu gewährleisten	
Sina Badesand für Geflügel	25	k.A.	Einstreuhöhe ca. 5-10 cm	Ermessenssache, k.A.	Ermessenssache, k.A.	An einer trockenen, geschützten Stelle im Gehege in einer Wanne oder einem Sandbad anbieten