



DAS ENERGIEREICHE FUTTER ZUM LECKEN

Version: 07.2020

Organyx Garlic (Mintgrün)

Für Rinder, Schafe, Ziegen und Gatterwild

Inhaltsstoffe:	Rohprotein	3,5 %	Calcium	4,0 %
	Rohfaser	0,2 %	Phosphor	2,0 %
	Rohfett	2,0 %	Natrium	3,0 %
	Rohasche	26,0 %	Magnesium	0,2 %
	Feuchtigkeit	max.5,0 %	Zucker	35,0 %

Zusatzstoffe je kg:	Mangan	800 mg	Kobalt	12 mg
	Zink	1.000 mg	Selen	9 mg
	Jod	60 mg		

Zusammensetzung: Melasse* (dehydriert); Monocalciumphosphat; Calciumcarbonat; Natriumchlorid; Knoblauchsatz (2,5%); Pflanzenfettsäure*

*aus biologischer Produktion

Nutzen:

- Eignet sich für die ökologische Produktion gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008
- Optimiert die tierische Leistung durch Steigerung der Grundfutteraufnahme und -verdaulichkeit
- Versorgt die Tiere mit allen notwendigen Mengen- und Spurenelementen
- Enthält natürliche Bestandteile des Knoblauchs zur ernährungsphysiologischen Unterstützung vieler Stoffwechselfunktionen
⇒ Hinweis: Schwefelhaltige Substanzen des Knoblauchs werden zum Teil über die Haut ausgeschieden und bewirken den charakteristischen Knoblauchgeruch, der von fliegenden Insekten häufig als unattraktiver Geruch wahrgenommen wird. Hilft, natürliche Qualitätsschwankungen des Grundfutters bzw. der Weide auszugleichen



Dieses Futtermittel kann in der ökologischen Produktion gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwendet werden. GB-ORG-05; Nicht-EU-Landwirtschaft Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL-Liste, www.betriebsmittelliste.de)

Fütterungsempfehlung:

2 x 80 kg-Kübel/ 50 Rinder/ 100 Schafe

2 x 22,5 kg-Kübel/ 20 Rinder/ 40 Schafe

Immer zwei Kübel je Tiergruppe aufstellen, um Rangkämpfe zu vermeiden.

Durchschnittliche Aufnahme:

Kühe: 150-250 g/Tag

Aufzuchtrinder: 100-150 g/Tag

Schafe: 40-60 g/Tag

Enthält Knoblauch-Bestandteile. Ein negativer Einfluss auf die sensorischen Eigenschaften von Milch und Fleisch kann nicht ausgeschlossen werden. Zur Sicherheit nicht an laktierende Tiere (Konsummilch) verfüttern. Bei Masttieren vier Wochen vor der Schlachtung absetzen.

Erhältlich in 80 kg- und 22,5 kg-Kübeln.