

InsektEx pour-on

ANWENDUNGSBEREICH

DESINTEC® InsektEx pour-on ist eine gebrauchsfertige Lösung zur äußeren Anwendung bei Rindern für die Bekämpfung von Fliegen und Gnitzen. Das registrierte Biozidprodukt auf Pyrethroid-Basis ist ausschließlich bei Rindern (besonders während der Weideperiode) einsetzbar.

Eine wirksame Fliegen- und Gnitzenbekämpfung auf der Weide bedeutet:

- Geringere Belästigung durch Weidelästlinge (Augenfliegen, Weidestechfliegen, Bremsen etc.)
- mögliche Vermeidung einer Übertragung von Krankheiten durch Insekten (z.B. Sommermastitis oder Blauzungenkrankheit)

ANWENDUNGS- und DOSIERUNGSEMPFEHLUNG

Dosis DESINTEC® InsektEx pour-on:

10 ml je 100 kg Gewicht (!Höchstdosierung 25 ml/Tier!) auf dem Rücken der Rinder anwenden.

Das Gewicht der Tiere ist richtig zu bestimmen. Eine Über- und Unterdosierung ist zu verhindern. Zur Erreichung eines optimalen Schutzes ist eine gleichzeitige Behandlung von allen Tieren einer Herde empfehlenswert.

Die Gesamtdosis von DESINTEC® InsektEx pour-on ist auf der Rückenlinie (vom Kopf bis zum Schwanzansatz) der Rinder aufzugießen. Dabei ist darauf achten, dass circa 1/4 der Gesamtdosis auf dem Kopf verteilt wird. Das Produkt darf nicht in die Augen der Tiere gelangen! DESINTEC® InsektEx pour-on sollte nur auf gesunde Hautpartien aufgetragen werden.

DESINTEC® InsektEx pour-on sollte weder von Tieren noch von Menschen oral (innerlich) aufgenommen werden.

WIRKUNGSDAUER

DESINTEC® InsektEx pour-on zeigt auf Grund seiner besonderen Formulierung eine sehr lange Wirkungsdauer von mindestens 7 Wochen. Alle Tiere einer Herde je nach Bedarf gleichzeitig behandeln. Empfehlenswert ist eine Wiederholung der Anwendung in Abständen von 11 Wochen

Frist für die Nutzung vor dem Schlachten: 3 Tage

WIRKSTOFF

36 g/L Permethrin (CAS 52645-53-1)

InsektEx pour-on

SICHERHEIT

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein: Arzt aufsuchen, wenn Krankheitssymptome auftreten.

Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt: Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken: Reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen.

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Wenn möglich, ihm dieses Datenblatt vorlegen.

Falls nicht vorhanden, Verpackung oder Etikett zeigen.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Gebinde: 1 ltr. Dosierflasche und 2,5 ltr. Flasche (inkl. Dosierpistole)

BEI ALLEN REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN IST SCHUTZKLEIDUNG EINSCHLIEßLICH
DICHTER SCHUTZBRILLE UND ATEMSCHUTZMASKE UNERLÄSSLICH!

REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONS-MITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!

**BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.**