

P1 Junior FM Gold

Alleinfutter für Puten in den ersten beiden Lebenswochen

Einsatzgebiete:

Alleinfutter für Putenküken in den ersten beiden Lebenswochen

Eigenschaften:

- ✓ enthält wertvolles Protein aus Fischmehl
- ✓ liefert Nährstoffe für ein gesundes und homogenes Wachstum der Puten
- ✓ feinkrümeliges Granulat fördert die Futteraufnahme ab dem ersten Tag

Inhaltsstoffe:

27,50% Rohprotein, 4,60% Rohfett, 3,50% Rohfaser, 8,00% Rohasche, 1,75% Lysin, 0,65% Methionin*, 1,35% Calcium, 1,00% Phosphor, 0,13% Natrium, Energie: 11,6 MJ ME/kg

Zusammensetzung:

Sojaextraktionsschrotfutter**, Weizen, Mais, Sojabohnen**, Fischmehl, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Pflanzenöl (Palm), Pflanzenfettsäuren, Natriumchlorid, Hefen und Teile von Hefen

* berechnet als Methioninäquivalent aus, nativem Methionin und dem Zusatz des Hydroxy-, Analogs von Methionin (Gesamtsäure)

** hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen

Zusatzstoffe je kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

9625 IE Vitamin A (3a672a), 4813 IE Vitamin D3 (3a671), 101 mg Vitamin E (3a700), 11 mg Kupfer (3b405) als Kupfer(II)-, sulfat, Pentahydrat, 34,4 mg Eisen (3b103) als Eisen-(II)-, sulfat, Monohydrat, 66 mg Zink (3b605) als Zinksulfat, Monohydrat, 88 mg Mangan (3b502) als Mangan-(II)-oxid, 1,4 mg Jod (3b202) als Calciumjodat, wasserfrei, 0,33 mg Selen (3b801) als Natriumselenit, 2700 mg Hydroxy-Analog von, Methionin (3c307) (min. 88% Gesamtsäure), 1543 mg L-Lysin aus L-Lysin-Sulfat, (3c324)

Technologische Zusatzstoffe:

19,3 mg Butylhydroxytoluol (BHT)(E321), 8,0 mg Propylgallat (E310), Citronensäure (E330) Ameisensäure (E236), Propionsäure (E280), 1,8 mg Sepiolit (E562)

Kokzidiostatika und Histomonostatika:

96 mg Monensin/Nicarbazin (51776)

Fütterungsempfehlung:


Den Putenküken ständig Zugang zu Futter gewähren (*ad libitum*). In den ersten beiden Lebenswochen ergibt sich ein Futterbedarf von ca. 0,3 kg je Henne und ca. 0,4 kg je Hahn.

Hinweis:

Dieses Futtermittel enthält ein Ionophor. Die gleichzeitige Verabreichung von Tiamulin ist zu vermeiden und auf mögliche Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Verwendung anderer Arzneimittel ist zu achten. Verabreichung mindestens 5 Tage vor der Schlachtung unzulässig. Gefährlich für Equiden. Enthält Fischmehl - Darf nicht an Wiederkäuer verfüttert werden.

Erhältlich in:

25 kg Papiersack (Art. Nr. 9568379)



Änderungen vorbehalten; maßgeblich ist die Deklaration auf dem jeweiligen Produkt.