



## Kükenstarter Gold

### Alleinfutter für Hühnerküken

#### Einsatzgebiete:

Alleinfuttermittel für Hühnerküken (Legehenne, Masthähnchen) ab dem Schlupf.

#### Eigenschaften:

- ✓ mit Kokzidiostatikum
- ✓ vollständige Versorgung ab dem Schlupf
- ✓ pelletiert 2 mm

#### Inhaltsstoffe:

21,00% Rohprotein, 4,10% Rohfett, 3,40% Rohfaser, 6,70% Rohasche, 1,10% Calcium, 0,70% Phosphor, 0,15% Natrium, 1,10% Lysin, 0,45% Methionin\*\*, Energie: 11,4 MJ ME/kg

#### Zusammensetzung:

Sojaextraktionsschrot\*, Weizen, Mais, Weizenkleie, Calciumcarbonat, Weizenkleie, Pflanzenfettsäuren (Sonne, Raps, Mais), Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat

\* Hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen

\*\* Gesamtgehalt an Methionin besteht aus nativem Methionin und dem Zusatz des Hydroxy-Analogs von Methionin (Gesamtsäure)

#### Zusatzstoffe je kg:

*Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:*

8000 I.E. Vitamin A (3a672a), 3200 I.E. Vitamin D3 (3a671), 45 mg Vitamin E (3a700), 396 mg Betainhydrochlorid (3a925), 30 mg Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103), 10 mg Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405), 60 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605), 80 mg Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502), 1,2 mg Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202), 0,30 mg Selen als Natriumselenit (3b801), 2370 mg Hydroxy-Analog von Methionin (3c307)

*Technologische Zusatzstoffe:*

1275 mg Ameisensäure (1k236), 500 mg Propionsäure (1k280), 15 mg Sepiolit (E562)

*Kokzidiostatika und Histomonostatika:*

100 mg Monensin-Natrium (51701)

#### Fütterungsempfehlung:

Den Hühnerküken ständig Zugang zu Futter gewähren (*ad libitum*). In den ersten drei Lebenswochen ergibt sich bei Legerassen ein Futterbedarf von ca. 0,5 kg je Küken. Masthähnchen haben in den ersten 10 Lebenstagen einen Bedarf von 0,25 kg je Küken.

#### Hinweis:

Dieses Futtermittel enthält ein Ionophor. Nur an Hühnerküken bis zum Alter von 16 Wochen verfüttern. Die gleichzeitige Verabreichung von Tiamulin ist zu vermeiden und auf mögliche Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Verwendung anderer Arzneimittel ist zu achten. Verabreichung mindestens einen Tag vor der Schlachtung unzulässig. Gefährlich für Equiden.

#### Erhältlich in:

5 kg Beutel (Art. Nr. 1308124)

25 kg Papiersack (Art. Nr. 21749393)

