

## Kükenaufzucht Gold

### Alleinfutter für Hühnerküken

#### Einsatzgebiete:

Alleinfuttermittel für die Aufzucht von Hühnerküken

#### Eigenschaften:

- ✓ mit Kokzidiostatikum
- ✓ für die Aufzucht von Legerassen ab 4. Lebenswoche
- ✓ mehlförmig

#### Inhaltsstoffe:

18,00% Rohprotein, 4,00% Rohfett, 4,00% Rohfaser, 5,90% Rohasche, 1,10% Calcium, 0,70% Phosphor, 0,16% Natrium, 1,05% Lysin, 0,43% Methionin\*\*

#### Zusammensetzung:

Weizen, Mais, Sojaextraktionsschrot\*, Sonnenblumenextraktionsschrot, Weizenkleie, Rapsextraktionsschrot, Calciumcarbonat, Pflanzenfettsäuren (Sonne, Mais, Raps, Soja), Monocalciumphosphat, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid

\* Hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen

\*\* Gesamtgehalt an Methionin besteht aus nativem Methionin und dem Zusatz des Hydroxy-Analogs von Methionin (Gesamtsäure)

#### Zusatzstoffe je kg:

*Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:*

8000 I.E. Vitamin A (3a672a), 2400 I.E. Vitamin D3 (3a671), 30 mg Vitamin E (3a700i), 30 mg Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103), 10 mg Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405), 50 mg Zink als Zinkchelat des Hydroxyanaloges von Methionin (3b610), 80 mg Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502), 1,2 mg Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202), 0,30 mg Selen als Natriumselenit (3b801)

*Technologische Zusatzstoffe:*

1604 mg Ameisensäure (1k236), 342 mg Milchsäure (1a270), 27 mg Propionsäure (1k280), 27 mg Citronensäure (1a330), 7 mg Propylgallat (E310), 17 mg Butylhydroxytoluol (BHT; E321), 66 mg Sepiolit (E562)

*Sensorische Zusatzstoffe:*

4,0 Canthaxanthin (2a161g)

*Kokzidiostatika und Histomonostatika:*

100 mg Monensin-Natrium (51701)

#### Fütterungsempfehlung:

Den Hühnerküken ständig Zugang zu Futter gewähren (*ad libitum*). In den Lebenswochen 4 bis 8 ergibt sich bei Legerassen ein Futterbedarf von ca. 2 kg je Küken.

#### Hinweis:

Dieses Futtermittel enthält ein Ionophor. Nur an Hühnerküken bis zum Alter von 16 Wochen verfüttern. Die gleichzeitige Verabreichung von Tiamulin ist zu vermeiden und auf mögliche Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Verwendung anderer Arzneimittel ist zu achten. Verabreichung mindestens einen Tag vor der Schlachtung unzulässig. Gefährlich für Equiden.

#### Erhältlich in:

25 kg Papiersack (Art. Nr. 21749391)

