



Geflügelmast Gold

Alleinfutter für Masthähnchen (Broiler)

Einsatzgebiete:

Dieses Alleinfuttermittel ist für die Mastphase der intensiven Geflügelzucht (Hähnchen) geeignet.

Eigenschaften:

- ✓ mit Kokzidiostatikum
- ✓ für die intensive Aufzucht von Masthähnchen
- ✓ pelletiert (3 mm)

Inhaltsstoffe:

19,50% Rohprotein, 5,80% Rohfett, 2,70% Rohfaser, 5,10% Rohasche, 1,20% Lysin, 0,50% Methionin**, 0,80% Calcium, 0,50% Phosphor, 0,15% Natrium, Energie: 12,7 MJ ME/kg

Zusammensetzung:

Mais, Sojaextraktionsschrotfutter*, Weizen, Pflanzenfettsäuren (Sonne, Mais, Raps, Soja), Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid

Zusatzstoffe je kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

8.000 IE Vitamin A (3a672a), 4.000 IE Vitamin D3 (3a671), 50 mg Vitamin E (3a700i), 10 mg Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405), 50 mg Zink als Zinkchelate des Hydroxyanaloges von Methionin (3b610), 80 mg Mangan als Mangan-(II)-oxid (3b503), 1,2 mg Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202), 0,30 mg Selen als Natriumselenit (3b801)

* Hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen

** Gesamtgehalt an Methionin besteht aus nativem Methionin und dem Zusatz des Hydroxy-Analoges von Methionin (Gesamtsäure)

Zusatzstoffe je kg:

Technologische Zusatzstoffe:

2406 mg Ameisensäure (1k236), 513 mg Milchsäure (1a270), 40 mg Propionsäure (1k280), 40 mg Citronensäure (1a330), 7 mg Propylgallat (E310), 17 mg Butylhydroxytoluol (BHT)(E321), 116 mg Sepiolit (E562)

Kokzidiostatika und Histomonostatika:

100 mg Monensin-Natrium (51701)

Fütterungsempfehlung:

Dieses Futter kann ganztägig zur Verfügung gestellt werden (ad libitum).

Die Fütterung an Masthähnchen ab 11. Lebenstag. Futtermengen je Hähnchen abhängig von Genetik und Haltungsbedingungen ca. 2 kg bis 30. Lebenstag, bzw. ca. 2,75 kg bis 35. Lebenstag.

Die Fütterung mit *GoldDott Geflügelmast Gold* sollte spätestens 5 Tage vor der Schlachtung beendet werden (Wartezeit). Die letzten Tage bis zur Schlachtung wird *GoldDott Geflügel Endmast* empfohlen.

Hinweis:

Dieses Futtermittel enthält ein Ionophor. Nur an Mastgeflügel bis zum Alter von 16 Wochen verfüttern. Die gleichzeitige Verabreichung von Tiamulin ist zu vermeiden und auf mögliche Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Verwendung anderer Arzneimittel ist zu achten. Gefährlich für Equiden. Verabreichung mindestens einen Tag vor der Schlachtung unzulässig.

Erhältlich in:

25 kg Papiersack (Art. Nr. 9575908)

