

# AnoEx

## ANWENDUNGSBEREICH

- **DESINTEC® AnoEx** ein flüssiges Streich- und Spritzmittel gegen adulte Fliegen im Stall
- Fraß- und Kontaktinsektizid
- hervorragende Sofortwirkung sowie eine Dauerwirkung von bis zu 6 Wochen.
- attraktiver Lockstoff für Stallfliegen (*Musca autumnalis*) und Stubenfliegen (*Musca domestica*)
- für eine nachhaltige Fliegenreduzierung ist ein **kombinierter Einsatz von DESINTEC® AnoEx gegen adulte Fliegen und DESINTEC® CyroEx gegen Larven** in der Gülle zu empfehlen.



## ANWENDUNGS- und DOSIERUNGSEMPFEHLUNG

Für einen Stall von 200 m<sup>2</sup> Bodenfläche werden 500 ml DESINTEC® AnoEx benötigt.

### 1. STREICHVERFAHREN



- bevorzugt dort aufbringen, wo Fliegen sich aufhalten.
- die streichfähige Paste mit einem Pinsel unverdünnt auf vielen kleinen Flächen (für 200 m<sup>2</sup> Stallgrundfläche ca. 60 Streifen a 10 x 30 cm) an Wänden, Pfosten, Leitungen usw. in Tiernähe (jedoch außerhalb der Reichweite der Tiere) auftragen.

### 2. SPRITZVERFAHREN



- für 200 m<sup>2</sup> Stallgrundfläche werden 500 ml DESINTEC® AnoEx in 1,0 Liter Wasser eingerührt und mit einer Rücken- oder Handspritze bei geringem Druck gleichmäßig auf vielen Stellen, wo sich Fliegen bevorzugt aufhalten, an Wänden, Pfosten, Leitungen usw. in Tiernähe (jedoch außerhalb der Reichweite der Tiere) ausgespritzt.
- mit der Spritzbrühmenge von 1,5 l sollten viele kleine Flächen (ca. 60) behandelt werden.
- die angerührte Spritzbrühe ist am Tag der Zubereitung auszubringen.

## ALLGEMEINE BEACHTUNG

- in Ställen, in denen keine ausreichenden Anstreich- bzw. Ansprühmöglichkeiten vorhanden sind empfiehlt sich ein Aufhängen von ca. 60 bestrichenen bzw. besprühten Pappkartonstreifen.
- während der Anwendung können die Nutztiere im Stall bleiben. Es muss aber sichergestellt sein, dass die Tiere den Belag nicht erreichen bzw. ablecken können. Ein Besprühen der Tiere sowie Über- und vor allem Unterdosierungen sind zu vermeiden.
- verschmutzte, poröse, saugfähige oder feuchte Flächen nicht behandeln.
- bei starker Staubentwicklung im Stall ist die Behandlung bei Bedarf zu wiederholen.
- es kann zu einer schwachen Verfärbung der behandelten Flächen kommen.



# AnoEx

## Wirkstoff

Chlothianidin

## SICHERHEIT (Konzentrat)

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

## Gebindegröße

500 ml Dose

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ist Schutzkleidung einschließlich dichter Schutzbrille und Atemschutzmaske unerlässlich.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht mit anderen chemischen Wirkstoffen (z.B. andere Reinigungs- und Desinfektionsmittel) mischen.

**BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG  
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.**