

A-Futter

ToxiCrack

ist ein Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung der Tiere bei mykotoxininduzierten Belastungen, wie beispielsweise mit Deoxynivalenol (DON), Fumonisin (FB₁) und Zearalenon (ZEA), für Schweine und Geflügel

Einsatzbereiche:

ToxiCrack ist aufgrund seiner komplexen Zusammensetzung in der Lage den Organismus in Zeiten erhöhter Mykotoxinbelastungen bioregulatorisch zu unterstützen. ToxiCrack enthält EU-zugelassene Zusatzstoffe zur Deaktivierung von DON, T-2 und Fumonisin (FB₁), sowie zur Bindung von Aflatoxin, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist.

Einsatz bei Intoxikation mit Mykotoxinen sowie bei toxischen Folgeerscheinungen bei den Tieren, wie z.B.:

- Vulvaschwellungen
- Rückläufige Futteraufnahmen
- Durchfallerscheinungen
- Leistungsrückgängen
- Immundepressionen

Zusammensetzung:

Weizenschlempe, getrocknet; Luzernegrünmehl, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Hefe, Pflanzenöl (Raps), Seealgenmehl, Distelsaat (Expeller)

Inhaltsstoffe: Rohprotein 12,0 %, Rohfett 4,0 %, Rohfaser 5,5 %, Rohasche 50,0 %, Calcium 2,7 %, Phosphor 1,15 %, Natrium 0,30 %

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

510 mg Vitamin B₁ (3a821), 750 mg Vitamin B₂ als Riboflavin, 900 mg Vitamin B₆ als Pyridoxinhydrochlorid (3a831), 3.000 µg Vitamin B₁₂, 3.000 mg Calcium-D-Panthenat (3a841), 4500 mg Niacinamid (3a315), 300 mg Vitamin K

Technologische Zusatzstoffe:

Sepiolit (E562), Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (1g568), Bentonit (1m558), Mikroorganismus-Stamm DSM 11798 der Coriobacteriaceae-Familie (1m01), Fumonisinesterase EC

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern
Kostenlose Hotline: Herr Berg 0800 . 682-1133 oder www.miravit.de

01/18

Anwendungsempfehlung:

- Schwein/Geflügel: 5 – 15 kg pro Tonne Trockenfutter (0,5 – 1,5 % der Tagesration)

Einsatzzeitraum:

MIRAVIT ToxiCrack ist während der gesamten Mykotoxinbelastungsphase entsprechend der Fütterungsempfehlung anzuwenden. Zur Regeneration des Organismus empfiehlt es sich, nach der Belastungsphase eine 7 tägige Versorgung mit Vitalstoffen (MIRAVIT VitalExtra oder VitaAqua Plus) zur Erhöhung der Vitalität durchzuführen.

Die Einsatzempfehlungen dieser Produkte sind den entsprechenden Produktinformationen zu entnehmen!

! Hinweis:

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden!

Für Geflügel: Die gleichzeitige Verabreichung von Robenidin ist zu vermeiden!

Haltbarkeit:

180 Tage nach Herstellung

Abpackung:

25 kg Sack

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern
Kostenlose Hotline: Herr Berg 0800 . 682-1133 oder www.miravit.de