

GoldDott Hähnchenmast + Cocci Alleinfuttermittel für Masthühnerküken (Broiler)

Einsatzgebiete:

- Ab der 3. Lebenswoche in der Langzeitmast bis 5 Tage vor der Schlachtung
- intensive Aufzucht (Hähnchenmast)

Eigenschaften:

- mit Kokzidiostatikum

Inhaltsstoffe: Rohprotein 21%, Rohfett 3,2%, Rohfaser 5,0%, Rohasche 6,0%, Lysin 1,1%, Methionin 0,48%, Calcium 0,9%, Phosphor 0,7%, Natrium 0,15%, Energie 11,4 MJ ME/kg

Zusatzstoffe je kg:

Zootechnische Zusatzstoffe:

1280 U Endo-1,4-beta-Xylanase, EC 3.2.1.8 (4a11)

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 7.000 i.E.

Vitamin A (3a672a), 3.500 i.E. Vitamin D3 (3a671),

24 mg Vitamin E (3a700), 12 mg Kupfer als Kupfer-

(II)-Sulfat, Pentahydrat (E4), 57 mg Eisen als

Eisencarbonat (3b101), 60 mg Zink als Zinksulfat,

Monohydrat (3b605), 80 mg Mangan als Mangan-

(II)-Oxid (3b502), 1,2 mg Jod als Calciumjodat,

wasserfrei (3b202), 0,35 mg Selen als

Natriumselenit (E8), 1.840 mg Hydroxy-Analog von

Methionin (mind. 88% Gesamtsäure) berechnet als

Methioninequivalent aus nativem Methionin und

dem Zusatz des Hydroxy-Analogs von Methionin

(Gesamtsäure) (3c307)

Technologische Zusatzstoffe: 17 mg

Butylhydroxytoluol (BHT) (E321), 7,0 mg

Propylgallat (E310), Zitronensäure (E330),

Ameisensäure (E236), Milchsäure (E270),

Propionsäure (E280)

Kokzidiostatika und Histamonostatika:

100 mg Monensin-Natrium (51701)

Zusammensetzung:

Weizen, Mais, Sojaextraktionsschrotfutter , Stock, aus geschälter Saat (dampferhitzt)*, Sonnenblumenextraktionsschrotfutter, Stock, aus geschälter Saat, Rapsextraktionsschrotfutter, Stock, Pflanzenfettsäuren, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Ca-Na-Phosphat, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid
*Hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen

Produktinformationen:

Verabreichung mindestens einen Tag vor der Schlachtung unzulässig. Das bedeutet, spätestens ein Tag vor einer Schlachtung muss auf GoldDott GeflügelFinisher umgestellt werden
Gefährlich für Equiden. Dieses Futtermittel enthält ein Ionophor, gleichzeitige Verabreichung von Tiamulin ist zu vermeiden, und auf mögliche Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Verwendung anderer Arzneimittel ist zu achten.

Fütterungsempfehlung:

Futterbedarf für Broiler (Masthähnchen) ab der 3. Lebenswoche ca. 2 kg je Tier.
Um die Aufnahme des Futters sicherzustellen, die Tagesmenge regelmäßig frisch vorlegen.
Ausreichend frisches Tränkwasser anbieten und bei Weidegang die tägliche Futtergabe anpassen.

Hinweis:

Das Bereitstellen des GoldDott cura Pickblocks im 5 kg Eimer bzw. die GoldDott Geflügel Luzerne fördert das natürliche Pickverhalten, beschäftigt das Geflügel und beugt Federpicken und Kannibalismus vor.

Erhältlich in: 25 kg-Papiersack

Die genauen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Produktes.