

## GoldDott Putenstarter P2 + Cocci Alleinfuttermittel für Truthühnerküken

### Einsatzgebiete:

- Alleinfutter für Puten ab der dritten bis fünften Lebenswoche

### Eigenschaften:

- pelletiert für eine gleichmäßige Versorgung der Tiere

**Inhaltsstoffe:** Rohprotein 26%, Rohfett 4,6%, Rohfaser 3,0%, Rohasche 7,9%, Lysin 1,6%, Methionin 0,62%, Calcium 1,25%, Phosphor 0,95%, Natrium 0,15%, Energie 11,6 MJ ME/kg

### Zusatzstoffe je kg:

Zootechnische Zusatzstoffe: 500 FTU 3-Phytase EC 3.1.3.8 (4a1600), 1280 U Endo-1,4-Beta-Xylanase, EC 3.2.1.8 (4a11)  
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 9.625 i.E. Vitamin A (3a672a), 2.813 i.E. Vitamin D3 (3a671), 100 mg Vitamin E (3a700), 12 mg Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat (E4), 57 mg Eisen als Eisencarbonat (3b101), 60 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605), 80 mg Mangan als Mangan-(II)-Oxid (3b502), 1,2 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,35 mg Selen als Natriumselenit (E8), 3.250 mg Hydroxy-Analog von Methionin (mind. 88% Gesamtsäure) berechnet als Methioninequivalent aus nativem Methionin und dem Zusatz des Hydroxy-Analogs von Methionin (Gesamtsäure), (3c307)  
Technologische Zusatzstoffe:  
17 mg Butylhydroxytoluol (BHT) ( E321), 7,0 mg Propylgallat (E310), Zitronensäure (E330), Ameisensäure (E236), Milchsäure (E270), Propionsäure (E280)  
Kokzidiostatika und Histomonostatika:  
90 mg Lasalocid-A-Natrium (51763)

### Zusammensetzung:

Weizen, Sojaextraktionsschrotfutter , Stock (dampferhitzt)\* , Sojaextraktionsschrotfutter , Stock, aus geschälter Saat (dampferhitzt)\*, Mais Calciumcarbonat, Pflanzenfettsäuren (Kokos/Palm), Pflanzenfettsäuren, Pflanzenfettsäuren Gerste, Weizenkleie, Haferschälkleie, Rapsöl, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat

\*Hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen

### Produktinformationen:

Verabreichung mindestens 5 Tage vor der Schlachtung unzulässig. Das bedeutet, spätestens 5 Tage vor einer Schlachtung muss auf GoldDott GeflügelFinisher umgestellt werden Nur an Truthühner bis zum Alter von 16 Wochen verfüttern. Gefährlich für Equiden. Dieses Futter enthält ein Ionophor, gleichzeitige Verabreichung bestimmter Tierarzneimittel kann kontraindiziert sein.

### Fütterungsempfehlung:

Futterbedarf von der dritten bis fünften Lebenswoche ca. 2,5 kg (Hahn) und 2,0 kg (Henne). Um die Aufnahme des Futters sicherzustellen, die Tagesmenge regelmäßig frisch vorlegen. Ausreichend frisches Tränkwasser anbieten.

### Hinweis:

Das Bereitstellen des GoldDott cura Pickblocks im 5 kg Eimer bzw. die GoldDott Geflügel Luzerne fördert das natürliche Pickverhalten, beschäftigt das Geflügel und beugt Federpicken und Kannibalismus vor.

*Die genauen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Produktes.*

**Erhältlich in:** 25 kg-Papiersack