

Organyx Garlic

(mintgrün)

Energieresches Erganzungsfuttermittel zum Lecken

Fur Rinder, Schafe, Ziegen und Gatterwild

Inhaltsstoffe:	Rohprotein	3,5 %	Calcium	4,0 %
	Rohfaser	0,2 %	Phosphor	2,0 %
	Rohfett	2,0 %	Natrium	3,0 %
	Rohasche	26,0 %	Magnesium	0,2 %
	Feuchtigkeit	max.5,0 %	Zucker	35,0 %

Zusatzstoffe je kg:	Mangan	800 mg	Kobalt	12 mg
	Zink	1.000 mg	Selen	9 mg
	Jod	60 mg		

Zusammensetzung:

Melasse* (dehydriert); Monocalciumphosphat; Calciumcarbonat; Natriumchlorid; Knoblauchsatz (2,5%); Pflanzenfettsaure*
*aus biologischer Produktion

Nutzen:

- Enthalt Bestandteile des Knoblauchs. Nach der Aufnahme sondern die Tiere den Geruch des Knoblauchs ab. Dieser wirkt abstoend und unterstutzt die naturliche Abwehr gegen fliegende Insekten.
- Anstieg der Aktivitat und Anzahl der Pansenmikroben, dadurch Forderung des Pansenstoffwechsels. Daraus resultiert ein Anstieg der Futteraufnahme und Futterverdaulichkeit. Die Tiergesundheit und Leistungsbereitschaft der Tiere werden positiv beeinflusst.
- Schnelle und sichere Versorgung der Tiere mit Energie und Mineralstoffen, dadurch Sicherstellung des tierindividuellen Mineralstoff-Bedarfs.
- Prinzip der Selbstfutterung, dadurch Einsparung von Arbeitsaufwand und Zeit.
- Wetterbestandig, dadurch fur Weidefutterung geeignet.



Dieses Futtermittel kann in der okologischen Produktion gema den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwendet werden. GB-ORG-05; Nicht-EU-Landwirtschaft Gelistet in der Betriebsmittelliste fur den okologischen Landbau in Deutschland (FiBL-Liste, www.betriebsmittelliste.de)

Einsatzempfehlung:

Zur Unterstutzung der naturlichen Fliegenabwehr im Stall und auf der Weide. Der durchschnittliche Verzehr betragt bei erwachsenen Rindern 150 bis 250 Gramm je Tier und Tag, bei Schafen, Ziegen und Gatterwild 35 bis 75 Gramm je Tier und Tag. Bei erstmaliger Futterung kann sich der Verzehr fur 10 bis 20 Tage verdoppeln. Bei anhaltenden uberdurchschnittlichen Verzehrsmengen ist von Nahrstoff- oder Stoffwechseldefiziten auszugehen. Fur das 22,5 kg Gebinde sollten maximal 10 Rinder (20 Schafe, Ziegen, Gatterwild) vorgesehen werden. Wenn moglich immer zwei Behalter pro Tiergruppe aufstellen, um Rangkampfe zu vermeiden!

Hinweis: Enthalt Knoblauch-Bestandteile. Darf nicht an laktierende Tiere (Konsummilch) verfuttert werden. Bei Masttieren vier Wochen vor der Schlachtung absetzen

Verkaufseinheit: 22,5 kg Plastikkubel (mintgrun)



Fur weitere Informationen rufen Sie uns an: 0800 – 66 47 66 9 oder schauen Sie unter www.crystalyx.info