

## Contra Insect® Plus

Lösungsmittelfreies Emulsionskonzentrat mit Sofort- und Langzeitwirkung zur Bekämpfung von Fliegen, Stechfliegen, anderen Schadinsekten und Milben in Stallanlagen und Wirtschaftsräumen

### Produkt-Highlights auf einen Blick

- Flüssiges Stallspritzmittel-Konzentrat
- Sofort- und Langzeitwirkung gegen viele Insekten
- Geruchlos



### Wirkstoff(e)

150 g/l Etofenprox  
20 g/l Cypermethrin

### Eigenschaften und Wirkungsweise

**Contra Insect® Plus** ist frei von schädlichen Lösungsmitteln und dadurch geruchlos und umweltfreundlich. Das Mittel zeichnet sich durch eine gute Sofort- und langanhaltende Dauerwirkung aus.

Die hochwirksame Wirkstoffkombination aus Etofenprox und Cypermethrin, aus der Gruppe der Pyrethroide, verleihen **Contra Insect® Plus** eine ausgezeichnete Sofort- und Langzeitwirkung. **Contra Insect® Plus** führt über Kontakt und Fraß zu einem ausgezeichneten Bekämpfungserfolg gegen viele Schadinsekten in Stallungen und anderen Wirtschaftsräumen.

### Gebrauchsanleitung

Die erforderliche Mittelmenge von **Contra Insect® Plus** wird mit der jeweiligen Wassermenge intensiv vermischt, in das Spritzgerät (z.B. Rücken- oder Motorspritze) gefüllt und mit mäßigem Druck (ca. 3 bar) ausgebracht. Von Fliegen bevorzugte Stellen sind besonders sorgfältig zu behandeln.

Anwendungskonzentration	2,5 % ig in Wasser
Aufwandmenge	50 ml Spritzemulsion/m <sup>2</sup>

#### Beispiele:

25 ml **Contra Insect® Plus** + 1 Liter Wasser = 20 m<sup>2</sup> Fläche  
 125 ml **Contra Insect® Plus** + 5 Liter Wasser = 100 m<sup>2</sup> Fläche  
 500 ml **Contra Insect® Plus** + 20 Liter Wasser = 400 m<sup>2</sup> Fläche

Zur Bekämpfung von Milben (z.B. Rote Vogelmilbe) und Käfern (z.B. Getreideschimmelkäfer) müssen die Befallsstellen zunächst gründlich gereinigt und anschließend mit der angesetzten Spritzbrühe intensiv behandelt werden.

Die Emulsionslösung mit **Contra Insect® Plus** ist möglichst in Tiernähe in den Stallungen zu verteilen. Während der Behandlung können die Nutztiere im Stall bleiben. **Es muss aber gewährleistet sein, dass die Tiere den Belag nicht erreichen bzw. ab lecken können. Ein Besprühen der Tiere ist zu vermeiden. Das Mittel sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Jungtieren angewandt werden.** Deshalb sollte bei kompletten Stallspritzungen u. U. die Behandlung im leeren Stall (Service-Periode) durchgeführt werden.

..2/



# Contra Insect® Plus

## Fortsetzung von Seite 1

### Anwendungsbereich(e)

Durch verdünnen von **Contra Insect® Plus** mit Wasser entsteht eine stabile, anwendungsfertige Emulsion zur Bekämpfung von Fliegen, Bremsen, Mücken, Ameisen, Schaben, Käfern, Milben usw. Das Mittel ist mindergiftig und kann auch in belegten Ställen eingesetzt werden. Die Wirkung kann durch alkalische Untergründe, wie z.B. Kalkanstriche oder Kalkmörtel beeinträchtigt werden.

### Hinweise zum Schutz des Anwenders und der Umwelt

GefahrenEinstufung: N (Umweltgefährlich), Xi (Reizend)

Die Anwendung von **Contra Insect® Plus** darf nur nach Gebrauchsanweisung erfolgen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Unter Verschluss und unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Contra Insect® Plus** unter Verschluss getrennt von Lebens- und Futtermitteln, unzugänglich für Kinder und nur in verschlossener Originalverpackung aufbewahren.

Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere sowie für Bienen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

### Erste Hilfe

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

### Lagerung

**Contra Insect® Plus** in der Originalverpackung kühl, trocken, unter Verschluss getrennt von Nahrungs- und Futtermitteln lagern.

### Weitere Hinweise

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass **Contra Insect® Plus** bei Einhaltung unserer Gebrauchsanweisung für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus Lagerung und Anwendung aus. Wir haften für gleichbleibende Qualität von **Contra Insect® Plus**, das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.

### Abfallbeseitigung/Entsorgung

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen dem Hausmüll begeben. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- und Kreisverwaltung.

### Zulassung gemäß Biozid-Meldeverordnung

baua: Reg.-Nr. N-27117

### Lieferverpackungen

0315-210

12 x 500 ml PET-Flasche

Palette: 60 VE

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

